

大宠爱 - 赛拉菌素溶液产品介绍

兽用

15mg 30mg 45mg 60mg 120mg 240mg

【兽药名称】 通用名：赛拉菌素溶液

商品名：大宠爱 (Revolution®)

英文名：Selamectin Solution

汉语拼音：Sailajunsu Rongye

主要成分：赛拉菌素

【性状】 本品为无色至淡黄色溶液。

【药理作用】 阿维菌素 (Avermectin) 类驱体内外寄生虫药。赛拉菌素通过干扰虫体谷氨酸控制的氯离子通道使虫体发生快速、致死性和非痉挛性的神经肌肉麻痹，对体内 (线虫) 和体外 (节肢昆虫) 寄生虫有杀灭活性。

在犬、猫皮肤上使用本品后，药物经皮肤吸收进入血液，一部分药物在动物梳理被毛时经口进入消化道和血液。药物动力学研究表明，局部外用后血浆中的赛拉菌素表现出持久的吸收。试验数据表明皮肤 (特别是皮脂腺) 是赛拉菌素蓄积处，这保证在较长时间内皮毛上有可杀灭寄生虫的药物浓度，用药后 30 天收集的动物皮肤碎屑仍可杀灭蚤卵及其幼虫。

药物安全性研究以 10 倍推荐剂量给幼犬外用本品，没有观察到副作用；以 3 倍推荐剂量给心丝虫病犬外用本品，也没有观察到副作用。猫的安全性研究表明，以 10 倍推荐剂量给猫外用本品，没有观察到副作用；以 4 倍推荐剂量给心丝虫病猫外用本品，也没有观察到副作用。临床研究表明，本品可安全用于经常使用如疫苗、驱虫药、抗寄生虫药、抗生素、类固醇、项圈、洗发香波和药浴等兽用产品的动物身上。

【适应症】 用于治疗犬、猫的蛔虫、钩虫、疥螨、蚤和虱的感染；以及预防犬、猫心丝虫病。

【用法与用量】 以赛拉菌素计 外用 一次量 每 1kg 体重 犬、猫 6mg

用力向下按压管盖，刺透药管的密封处，移走管盖，给动物用药。将动物颈背后肩胛骨前部的毛发分开，暴露皮肤；使药管的尖端直接接触动物皮肤，挤压药管将整管药液挤到一处皮肤上，不需按摩用药部位，勿将药液用于破损皮肤。按下表所述经皮肤外用：

猫 (kg)	包装颜色	每管药量	药物浓度 (mg/ml)	使用量 (选用包装管的规格 -ml)
≤ 2.5	紫红色	15mg	60	0.25
2.6-7.5	兰色	45mg	60	0.75
>7.5	选择对应 2 管或 2 管以上药液合用			几管药液的总量按照【用法与用量】使用。

犬 (kg)	包装颜色	每管药量	药物浓度 (mg/ml)	使用量 (选用包装管的规格 -ml)
≤ 2.5	紫红色	15mg	60	0.25
2.6-5.0	紫色	30mg	120	0.25
5.1-10.0	棕色	60mg	120	0.5
10.1-20.0	红色	120mg	120	1.0
20.1-40.0	水鸭绿色	240mg	120	2.0
>40	选择对应 2 管或 2 管以上药液合用			几管药液的总量按照【用法与用量】使用。

【不良反应】 临床研究表明有不到 0.5% 的猫在用药部位或周围出现一过性的炎性或非炎性的脱毛，这可能是由于动物自己梳理造成的。另外有些临床试验犬、猫表现出可能与治疗无关的呕吐、流涎或腹泻。

- 【注意事项】** 1、本品仅限用于宠物，适用于6周龄和6周龄以上的犬、猫。
2、为了获得最好的用药效果，请勿在宠物毛发尚湿的时候使用本品，但在用药2小时后给宠物洗澡不会降低本品的药效。
3、本品易燃，要远离热源、火源。
4、禁止用于人，勿让儿童触及。
5、可能对皮肤和眼睛有刺激性，用后洗手。
6、皮肤接触到药物后应立即用肥皂和清水冲洗；如溅入眼内，用大量水冲洗；如不慎食入，应立即求助医生。
- 【有效期】** 3年
- 【规格】** (1)0.25ml: 15mg (2)0.75ml: 45mg (3)0.25ml: 30mg (4)0.5ml: 60mg (5)1.0ml: 120mg (6)2.0ml: 240mg (7)3.0ml: 360mg
- 【包装】** 3或6管/盒，10盒/箱。
- 【贮藏】** 遮光，密闭，在30°C以下保存。
- 【进口兽药注册证号】** (2015)外兽药证字06号
- 【生产企业】** 硕腾公司美国卡拉马祖生产厂 (Zoetis P & U, LLC, Kalamazoo, USA)
地址：2605 E.Kilgore Road, Kalamazoo, MI 49001, USA
- 【备注】** 文档中部分名称与产品包装中的说明书或有不符，因注册更新有一定滞后性，请以最新版本为准。