

## 速诺 - 阿莫西林克拉维酸钾注射液产品介绍

兽用

10ml

50ml

100ml

- 【兽药名称】** 通用名：阿莫西林克拉维酸钾注射液  
商品名：速诺<sup>®</sup>注射液 (Synulox<sup>®</sup> RTU)  
英文名：Amoxicillin and Clavulanate Potassium Injection  
汉语拼音：Amoxilin Kelaweisuanjia Zhushhey
- 【主要成分】** 阿莫西林、克拉维酸钾。
- 【性状】** 本品为类白色至浅黄色的混悬液体。
- 【药理作用】** 抗生素类药。阿莫西林是一种广谱抗菌素，通过抑制细菌细胞壁合成而发挥杀菌作用；克拉维酸是一种  $\beta$ -内酰胺酶抑制剂。本品除了对阿莫西林敏感的革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌有杀灭作用外，对因产生  $\beta$ -内酰胺酶导致的阿莫西林耐药菌也有很强的杀菌活性。在体外，本品对以下常见的重要病原菌具有抗菌活性：金黄色葡萄球菌、链球菌、棒状杆菌、梭状芽孢杆菌、炭疽杆菌、牛放线杆菌等革兰氏阳性菌；大肠杆菌、沙门氏菌、弯曲杆菌、克雷伯氏菌、变形杆菌、巴氏杆菌、坏死性梭杆菌、类杆菌属、嗜血杆菌、莫拉菌属、李氏放线杆菌和胸膜肺炎放线杆菌等革兰氏阴性菌。
- 【适应症】** 用于家畜及小动物青霉素敏感菌引起的感染。
- 【用法与用量】** 以本品计。肌内或皮下注射：牛、猪、犬、猫，每 20kg 体重 1ml。每日 1 次，连用 3~5 日。
- 【不良反应】** 注射该产品后可能会引起少数动物的疼痛和局部组织反应。
- 【注意事项】** (1) 使用前充分摇匀，注射后轻轻按摩注射部位。  
(2) 进行此产品的注射操作时，避免接触到药物。对青霉素过敏者禁止接触本品。如接触到此产品并出现过敏症状（如皮疹，严重症状有脸部、眼睛或唇肿胀和呼吸困难）时，应该立刻去找医生救助。  
(3) 与其它青霉素类产品一样，本品不适用于家兔、豚鼠、仓鼠；在用于其它小的草食动物时，应慎用。  
(4) 使用完全干燥的针头和注射器，避免水滴污染瓶中剩余的药品。  
(5) 在首次使用后，剩余的药品应在 28 日内用完；过期未用药品应弃掉，并按当地环保部门的规定进行。  
(6) 不要让小孩接触到此产品。
- 【休药期】** 牛 42 日；猪 31 日；弃奶期 60 小时。
- 【规格】** (1) 10ml：阿莫西林 1.4g+ 克拉维酸 0.35g  
(2) 50ml：阿莫西林 7g+ 克拉维酸 1.75g  
(3) 100ml：阿莫西林 14g+ 克拉维酸 3.5g
- 【包装】**
- 【贮藏】** 避光，密封，在阴凉处保存。
- 【有效期】** 2 年
- 【进口兽药注册证号】** (2013) 外兽药证字 40 号、(2013) 外兽药证字 41 号、(2013) 外兽药证字 42 号
- 【生产企业】** 意大利 Haupt Pharma 生产厂 (Haupt Pharma Latina S.R.L.)  
地址：SS 156 Km 47,600-04100 Borgo San Michele, Latina, Italy
- 【备注】** 文档中部分名称与产品包装中的说明书或有不符，因注册更新有一定滞后性，请以最新版本为准。