

【兽药名称】 通用名：犬瘟热、腺病毒 2 型、副流感和细小病毒病四联活疫苗 - 犬钩端螺旋体病 (犬型、黄疸出血型) 二价灭活疫苗 - 犬冠状病毒病灭活疫苗

商品名：卫佳® 捌 (Vanguard® Plus 5-CVL)

英文名：Canine Distemper-Adenovirus Type 2-Coronavirus-Parainfluenza-Parvovirus Vaccine, Modified Live and Killed Virus, *Leptospira Canicola-Icterohaemorrhagiae* Bacterin

汉语拼音：Quanwenre Xianbingduerxing Fuliugan Xiaoxiaobingdubing Silian Huoyimiao Quangouduanluoxuantibing (Quanxing Huangdanchuxuexing) Erjia Miehuoyimiao Quanguanzhuangbingdubing Miehuoyimiao

【主要成分与含量】 每头份疫苗中含犬瘟热病毒 Snyder Hill 致弱株至少 $10^{2.5}$ TCID₅₀；含犬腺病毒 2 型 Manhattan 致弱株至少 $10^{2.9}$ TCID₅₀；含犬副流感病毒 NL-CPI-5 株至少 $10^{5.0}$ TCID₅₀；含犬细小病毒 NL-35-D 株至少 $10^{7.0}$ TCID₅₀；犬钩端螺旋体 C-51 株和黄疸出血型钩端螺旋体 NADL 株，灭活前均应不低于 600 浊度单位；犬冠状病毒 NL-18 株抗原的相对效力单位 (RP) 不低于 1.0。

【性状】 冻干疫苗部分为微黄色海绵状疏松团块；液体疫苗部分为澄明或轻度混浊的粉红色液体。两部分混合后，冻干团块迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防犬瘟热、犬腺病毒 1 型引起的传染性肝炎、犬腺病毒 2 型引起的呼吸道病、犬副流感、犬细小病毒病、犬冠状病毒病，以及犬钩端螺旋体和黄疸出血型钩端螺旋体引起的钩端螺旋体病。

【用法与用量】 用液体疫苗部分溶解冻干疫苗部分。皮下或肌肉注射，每次 1 头份 (1ml)。对 6 周龄或 6 周龄以上犬首次免疫，推荐连续接种 3 次，每次间隔 3 周。以后每年接种 1 次。

【不良反应】 接种疫苗后，个别犬可能出现过敏反应，此时，可用肾上腺素进行抢救，并采取适当的辅助治疗措施。

【注意事项】 (1) 仅用于接种健康犬；禁止接种怀孕母犬。

(2) 切勿冻结或长时间暴露于高温下。

(3) 疫苗瓶启封后，应一次用完。

(4) 接种时，应按常规无菌操作；注射器和针头不能使用化学方法消毒。

(5) 疫苗内含有青霉素和链霉素。

(6) 用过的疫苗瓶和未用完的疫苗应焚毁。

(7) 如果动物处于某些传染性疾病的潜伏期、营养不良、有寄生虫感染、处于运输或环境应激状态下或存在免疫抑制，或者未按说明书进行接种，均可能引起免疫失败。

【规格】 冻干疫苗部分：1 头份 / 瓶；液体疫苗部分：1ml / 瓶。

【包装】 25 头份 (50 瓶) / 盒

【贮藏与有效期】 2~8°C 保存，有效期为 18 个月。

【进口兽药注册证号】 (2016) 外兽药证字 10 号

【生产企业】 硕腾公司美国林肯厂 (Zoetis Inc., Lincoln, USA)

地址：601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska, 68521, USA

仅在兽医指导下使用

【备注】 文档中部分名称与产品包装中的说明书或有不符，因注册更新有一定滞后性，请以最新版本为准。