

# 吡啶醒

多咪静的特效苏醒剂

## 吡啶醒 - 盐酸阿替美唑注射液产品介绍

兽用

10ml: 50mg

**【兽药名称】** 通用名：盐酸阿替美唑注射液

商品名：吡啶醒 (Antisedan®)

英文名：Atipamezole Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan atimeizuo zhusheyue

**【主要成分】** 盐酸阿替美唑

**【性状】** 本品为无色的液体。

**【药理作用】** 抗肾上腺素类药物。阿替美唑是一种高效的  $\alpha_2$ -肾上腺素受体阻断剂 (拮抗剂)，它能选择性的和竞争性的抑制  $\alpha_2$ -肾上腺素受体。阿替美唑能消除 (或抑制)  $\alpha_2$ -肾上腺素受体兴奋剂右美托咪定注射液或美托咪定注射液引起的镇静与止痛作用。阿替美唑不会逆转其他类别的镇静剂、麻醉剂或止痛剂的作用。

肌肉注射后阿替美唑快速吸收；在大约 10 分钟内达到峰浓度。通常在注射后 5 到 10 分钟内有明显开始苏醒的迹象，具体情况取决于右美托咪定或美托咪定引起的镇静作用的深度与持续时间。血清中的消除半衰期小于 3 小时。阿替美唑主要在肝中氧化，代谢产物主要在尿液中排泄。

**【适应症】** 用于解除犬和猫右美托咪定的镇静和止痛作用，及逆转其他的作用，如心血管作用和呼吸作用。

**【用法与用量】** 肌肉注射：给药剂量与之前给予的多咪静 (Dexdomitor®) 相比，

(1) 按 ml 数计算，对于犬，与之前的相同；对于猫，减半。

(2) 按  $\mu\text{g}/\text{kg}$  计算，对于犬，为之前给予剂量的 10 倍；对于猫，为之前的 5 倍。

**【不良反应】** 偶尔可能出现呕吐、气喘、心动过速、大小便失禁与肌肉颤动。有时，注射阿替美唑的狗会出现激动或挑衅的阶段。阿替美唑的其他不良作用包括过度流涎，腹泻与震颤。

**【注意事项】** (1) 阿替美唑注射液能够产生突然的镇静和止痛逆转。在处理由镇静中苏醒的犬时应该考虑到不安或挑衅行为的潜在可能，特别是有神经过敏或恐惧倾向的犬。这时应避免刺激犬。

(2) 关于阿替美唑与其他药物联合使用的信息不多，因此，多种药物联合使用时要谨慎。应该密切监视动物的持续体温降低，心搏徐缓，与呼吸抑制等症状，直到完全恢复。老年、体虚的动物使用麻醉剂时应谨慎。

(3) 当阿替美唑逆转右美托咪定或美托咪定镇静有关的临床症状时，生理状况完全转至处理前的状态可能不是立即的或者可能是暂时的，所以应该监测镇静作用的复发。

(4) 阿替美唑注射液未在怀孕动物上进行评价；因此，该药物不推荐用于怀孕的或泌乳的动物，或用于繁殖的动物。

(5) 不得用于人。放置在儿童接触不到的地方。盐酸阿替美唑可以被吸收并且在直接接触皮肤，眼睛，或嘴部后可能引起刺激。一旦出现意外的眼睛接触，用水冲洗 15 分钟。一旦出现意外的皮肤接触，用香皂和水冲洗。脱掉污染的衣服。如果出现刺激或其他不良反应 (例如，心率提高，震颤，肌肉抽筋)，请咨询医生。一旦出现意外的口服或注射，请咨询医生。

(6) 禁用于出现以下症状的犬：心脏病、呼吸失常、肝或肾疾病、休克、严重虚弱或者处于极度热、冷或疲劳重压的犬。禁用于对该药物已知过敏的犬。

(7) 禁用于其他镇静剂 (如地西洋或阿片类药物等) 的作用。

(8) 注意  $\mu\text{g}/\text{kg}$  剂量是随着体重的增加而减少。对于猫，注射盐酸阿替美唑  $\mu\text{g}/\text{kg}$  剂量不得超过前面给予右美托咪定的 8 倍。

**【休药期】** 无。

**【规格】** 10ml: 50mg

**【包装】**

**【贮藏】** 在 15~30°C 下遮光保存。

**【有效期】** 3 年。开启后，28 日内用完。

**【进口兽药注册证号】** (2016) 外兽药证字 51 号

**【生产企业】** 芬兰 Orion 制药厂 Espoo 生产厂 (Orion Corporation, Orion Pharma Espoo site)

地址：Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland

**【备注】** 文档中部分名称与产品包装中的说明书或有不符，因注册更新有一定滞后性，请以最新版本为准。